## Уважаемые коллеги!

В этом номере журнала мы продолжаем публикацию цикла статей о работе с цитостатиками. Предлагаю вашему вниманию раздел на тему «Правила безопасного обращения с противоопухолевыми и иммунобиологическими препаратами».

О.В. Пименова, главная медицинская сестра НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

https://doi.org/10.21682/2311-1267-2020-7-1-82



## Правила безопасного обращения с противоопухолевыми и иммунобиологическими препаратами

Д.В. Литвинов, Н.В. Мякова, Ю.А. Шифрин, О.В. Пименова

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России; Россия, 117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1

Контактные данные: Ольга Владимировна Пименова olga.pimenova@fccho-moscow.ru

## Rules for the safe handling of antitumor and immunobiological preparations

D.V. Litvinov, N.V. Myakova, Yu.A. Shifrin, O.V. Pimenova

Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Ministry of Health of Russia; 1 Samory Mashela St., Moscow, 117997, Russia

Сегодня речь пойдет о правилах безопасного обращения с противоопухолевыми и иммунобиологическими препаратами.

Все материалы представлены с описанием шагов, действий и ответственных за них сотрудников.

Жду ваши вопросы, комментарии, предложения, пожелания, темы для будущего обсуждения.

## Правила безопасного обращения с противоопухолевыми и иммунобиологическими препаратами

При обращении с противоопухолевыми или иммунобиологическими препаратами, следует соблюдать следующие правила:

- 1. Использовать защитные нитриловые перчатки, маску, шапку, очки, одноразовый халат/фартук.
- 2. Готовить раствор необходимо в специально предназначенном помещении (вытяжном шкафу).
- 3. Не следует допускать контакта препарата с кожей и слизистыми оболочками, особенно необходимо беречь глаза.
- 4. Для предупреждения нарушения герметичности коннекторы должны точно подходить друг к другу.

- 5. Необходимо избегать повышенного давления во флаконах при их заполнении. Иглы с фильтром или одноразовые иглы помогают выпустить воздух из флакона и сбросить высокое давление внутри.
- 6. При разведении противоопухолевых и иммунобиологических препаратов растворитель во флакон должен вливаться медленно, струя должна быть направлена на стенку флакона, не встряхивать!!!
- 7. Адекватные меры предосторожности должны соблюдаться в отношении расходных материалов и инструментов (шприцы, иглы и т. д.).
- 8. Следует соблюдать сроки годности и условия хранения вскрытых многодозовых флаконов, указанные производителем.
- 9. Флаконы, ампулы, шприцы для разведения и инъекций, системы для внутривенных вливаний собираются в герметичные контейнеры, промаркированные надписью «Отходы. Класс Г».
- 10. Беременные женщины не должны контактировать с противоопухолевыми препаратами, биологическими жидкостями пациентов после проведения им полихимиотерапии!